


# लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार



## गाय का प्रजनन कैलेंडर



विस्तार शिक्षा निदेशालय

Compiled & Edited by Dr. Sarita, Dr. D. S. Dahiya & Dr. J. B. Phogat © All Copyrights reserved

- पहले प्रजनन के समय पशु का शारीरिक वजन उसके व्यस्क शारीरिक वजन का 60–70 प्रतिशत होना चाहिए।
- साधारणतः गाय हर 21वें (18–24) दिन गर्भी में आती है।
- अधिकांश पशु (60–70 प्रतिशत) गर्भी में सांय 6 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच आते हैं इसलिए पशुपालक को पशुओं को गर्भी में देखने के लिए कम से कम 24 घंटों में 3–4 बार जाँच जरूर करनी चाहिए।
- गाय को कृत्रिम गर्भाधान या उच्च कोटि के सांड से गाभिन कराना चाहिए।
- गर्भाधान से 2–3 महीनों के बाद गर्भावस्था की जाँच अवश्य करवायें।
- गाय में गर्भावस्था लगभग 270 दिन (261–279) की होती है।
- पशु समय से गर्भ तथा गर्भित हो इसके लिए उसे संतुलित आहार देना चाहिए। इसमें खनिज मिश्रण का विशेष महत्व है।
- ब्याने से अनुमानित तिथि में कम से कम दो महीने पहले ही दूध दोहना बंद कर दें ताकि अगले ब्यांत में दूध उत्पादन की वृद्धि व बछड़े—बछड़ी का सही विकास हो सके।



पशु क्रमांक	प्रजनन के समय पशु की आयु	गर्भाधान की तारीख	गर्भाधान का प्रकार		ब्यांत	शुष्क काल (टलने के दिन)	ब्याने से लेकर अगले गर्भाधान का अंतराल	ए.आई स्ट्रॉ का विवरण
			झोटे द्वारा	ए.आई				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								